

## La queue chez le cauchois

Bien que n'étant pas considérée comme un caractère essentiel du cauchois, la queue participe néanmoins à l'aspect général du pigeon et toute anomalie dans la forme ou la coloration de celle-ci porte atteinte à l'esthétique et à l'élégance de l'oiseau et lui interdit l'accès aux plus hautes récompenses. Voyons au travers de quelques photos les principales imperfections affectant cette partie du corps.



La queue chez le cauchois mesure environ 15 centimètres depuis la naissance des grandes plumes jusqu'à l'extrémité. Elle est située dans le prolongement du dos et suit son inclinaison sans toucher le sol. Elle est parfaitement plate et sa largeur est d'environ 8 à 9 centimètres. La largeur est pratiquement égale sur toute la longueur de la queue. Les deux photos ci-contre montrent des queues parfaites en implantation, épaisseur et largeur.



La queue se compose de 12 grandes plumes appelées rectrices ou penes caudales ayant une largeur d'environ 4 centimètres. Ces rectrices sont recouvertes à leur partie supérieure par une série d'une dizaine de plumes plus courtes disposées en demi-cercle que l'on appelle plumes de couverture de la queue.

De même, les rectrices sont protégées à leur partie inférieure par une dizaine de plumes formant ce que l'on appelle le coin.

Voyons à présent quelques photos montrant les principales imperfections pouvant altérer la forme de la queue .



La queue de ce pigeon n'est pas parfaitement plate, mais amorce une forme voûtée. C'est un défaut que l'on rencontre fréquemment de nos jours et qui se transmet facilement.



Le même défaut que ci dessus mais beaucoup plus accentué. Une telle queue pénalise gravement le sujet.



Ici une queue trop large et épanouie.



Les 2 photos ci-contre nous montrent un défaut grave fréquemment rencontré appelé : queue étage. Ne pas conserver pour la reproduction des sujets porteurs de cette tare fortement héréditaire.



